CRIOGÉIS DE AMIDO DE MILHO INCORPORADOS COM ÓLEO ESSENCIAL DE CRAVO (*Syzygium aromaticum*) COM ATIVIDADE ANTI-*Campylobacter jejuni* APLICADOS COMO ABSORVEDORES DE EXSUDATO PARA CARNE DE FRANGO

Natalie Rauber Kleinübing¹, Elder Pacheco da Cruz¹, Tassiana Ramires², Isabela Schneid Kroning¹, Eric Hiroyoshi Ossugui¹, Laura Martins Fonseca¹, Graciela Volz Lopes¹, Elessandra da Rosa Zavarese¹, Pamela Inchauspe Alves¹, Rosane Lopes Crizel¹, **Wladimir Padilha da Silva¹**

¹ Universidade Federal de Pelotas, Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Pelotas / RS, Brasil

² Universidade Federal do Pampa, Faculdade de Medicina Veterinária, Uruguaiana / RS, Brasil

A campilobacteriose, causada principalmente por *Campylobacter jejuni*, é a doença zoonótica mais reportada em diversos países. *Campylobacter jejuni* pode colonizar o intestino de frangos, os quais são considerados reservatórios primários desse patógeno. Desta forma, a campilobacteriose em humanos está fortemente associada à ingestão de carne de frango crua ou malcozida, ou ainda, à contaminação cruzada a partir da carne de frango. Como alternativas para o controle de *C. jejuni*, os óleos essenciais (OE) vêm sendo estudados, dentre eles, o OE de cravo (*Syzygium aromaticum*) (OEC) apresentou potencial devido à sua atividade antimicrobiana. Portanto, o objetivo deste estudo foi avaliar a atividade anti-*Campylobacter jejuni* de criogéis de amido de milho, com alta capacidade de absorção, impregnados com 10% de OEC, aplicados como absorvedores de exsudato para carne de frango. Para isso, selecionou-se um isolado, previamente caracterizado como *C. jejuni* e com perfil de multirresistência a antimicrobianos, o qual foi inoculado, na concentração de 4×10^8 UFC.mL⁻¹, em amostras de 10 g de peito de frango cru. As amostras contaminadas foram colocadas em recipientes plásticos, dispostas sobre criogéis de amido de milho, contendo 10% de OEC, sendo estocadas em temperatura de refrigeração (4 °C). Como controle, foram utilizados criogéis sem a adição de OEC. Após 48 h foi realizada a contagem das colônias típicas de *C. jejuni* em ágar seletivo mCCDA (ágar carvão cefoperazona desoxicolato modificado) nas amostras de peito de frango e nos criogéis, separadamente. A análise estatística foi realizada pela análise de variância (ANOVA), seguida pelo teste de comparação de médias de Tukey, com nível de significância de 5%. Após 48 h, observou-se redução significativa ($p < 0,0001$) na contagem de *C. jejuni*, de $8,15 \log_{10}$ UFC.g⁻¹ nas amostras acondicionadas sobre os criogéis sem a adição de OEC, para $6,89 \log_{10}$ UFC.g⁻¹ nas amostras dispostas sobre os criogéis contendo 10% de OEC, resultando em uma redução de $1,26 \log_{10}$ UFC.g⁻¹. Em relação aos criogéis, após 48 h de contato com a carne de frango, verificou-se uma contagem de *C. jejuni* de $8,24 \log_{10}$ UFC.g⁻¹ no criogel sem a adição de OEC, enquanto não foi detectada a presença de *C. jejuni* no criogel contendo 10% de OEC. O criogel de amido de milho incorporado com OEC, utilizado como absorvedor de exsudato para carne de frango, demonstrou-se eficaz em reduzir a contaminação da carne de frango com *C. jejuni*, bem como em eliminar a contaminação proveniente do exsudato da carne de frango, o qual pode atuar como uma fonte importante de contaminação cruzada para outros alimentos e ainda, favorecer a formação de biofilme por este patógeno. Além disso, uma redução de cerca de $1 \log_{10}$ nas contagens de *C. jejuni* em carcaças de frango tem sido associada a diminuição de 50 a 90% do risco à saúde pública, demonstrando a importância dos resultados obtidos neste estudo. O criogel de

IAFP Latino 2024

Simpósio Latinoamericano
em Segurança dos Alimentos
Santos - SP - Brasil
11 a 14 Nov, 2024

amido de milho contendo 10% de OEC reduziu significativamente *C. jejuni* na carne de frango, além de absorver e inibir a contaminação proveniente do exsudato da carne de frango, tendo potencial para a utilização como componente de uma embalagem ativa para alimentos, podendo contribuir para a minimização dos riscos de transmissão de *C. jejuni* por esse alimento.

Agradecimentos: CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior), CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, processos 312715/2023-4 e 151416/2024-9).

BRAFP

International Association for
Food Protection